

Písomná informácia pre používateľa

Panadol Horúci nápoj Mentol
500 mg prášok na perorálny roztok

paracetamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- **Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.**

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Panadol Horúci nápoj Mentol a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Horúci nápoj Mentol
3. Ako užívať Panadol Horúci nápoj Mentol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Panadol Horúci nápoj Mentol
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Panadol Horúci nápoj Mentol a na čo sa používa

Panadol Horúci nápoj Mentol je určený na úľavu od príznakov chrípky, prechladnutia a akútneho zápalu horných ciest dýchacích, ako je napr. horúčka, bolesť hlavy, bolesť v hrdle, bolesť kĺbov a svalov.

Liek je určený dospelým, mladistvým a deťom od 12 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Horúci nápoj Mentol

Neužívajte Panadol Horúci nápoj Mentol

- ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak trpíte žltackou, ťažkým pečevným zlyhávaním a ťažkou hemolytickou anémiou (málokrvnosť z dôvodu rozpadu červených krviniek).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Panadol Horúci nápoj Mentol, obráťte sa na svojho lekára:

- Ak máte problémy s pečevnou;
- Ak dlhodobo užívate vyššie dávky Panadolu Horúci nápoj Mentol je nutná pravidelná kontrola funkcie pečene. Nebezpečenstvo predávkovania je vyššie u pacientov s ochorením pečene.

- Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene paracetamolom.
- Paracetamol sa má užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s vrodeným nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách a u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorí môžu užívať liek len na odporúčenie lekára, pretože je u nich nevyhnutné, aby užívali nižšie dávky.

Deti a dospievajúci

Liek nie je určený deťom do 12 rokov.

Iné lieky a Panadol Horúci nápoj Mentol

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Panadol Horúci nápoj Mentol spolu s ďalšími liekmi obsahujúcimi paracetamol.

Účinky Panadolu Horúci nápoj Mentol a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Pred užitím Panadolu Horúci nápoj Mentol sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom:

- ak užívate lieky na zníženie krvnej zrážanlivosti (napr. warfarín);
- ak užívate lieky na liečbu tráviaceho traktu (napr. metoklopramid, domperidón) alebo na zníženie hladiny tukov v krvi (cholestyramín);
- ak užívate lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú;
- ak užívate niektoré antibiotiká (rifampicín);
- ak užívate niektoré lieky na liečbu epilepsie (fenobarbital).

Panadol Horúci nápoj Mentol a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene. Pred začiatkom liečby sa poraďte s lekárom, ak máte problémy s požívaním alkoholu.

Liek sa môže podávať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženiu účinku paracetamolu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotné ženy môžu liek užívať po porade s lekárom. Počas dojčenia je možné liek užívať 1 deň, ďalej len po porade s lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Panadol Horúci nápoj Mentol nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Panadol Horúci nápoj Mentol obsahuje sacharózu, sodík, aspartám a azofarbivá.

Obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

Obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje 118 mg sodíka v jednom vrecku. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

Liek obsahuje azofarbivá (E110, E122, E151), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.

3. Ako užívať Panadol Horúci nápoj Mentol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí (vrátane starších osôb) a dospelievajúci od 15 rokov

1 - 2 vrecká rozpustené v šálke horúcej vody 1 až 4-krát denne, odstup medzi jednotlivými dávkami najmenej 4 hodiny. Jedno vrecko je vhodné pre osoby s telesnou hmotnosťou 34 - 60 kg, 2 vrecká pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. **Maximálna denná dávka paracetamolu sú 4 g (8 vreciek).**

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Pacientom s poruchou funkcie obličiek určí dávkovanie lekár.

Deti 12 - 15 rokov

1 vrecko rozpustené v šálke horúcej vody s časovým odstupom najmenej 4 - 6 hodín. **Maximálna denná dávka sú 3 g paracetamolu (6 vreciek).**

Deťom do 12 rokov liek nepodávajúte.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Neužívajte s ďalšími liekmi obsahujúcimi paracetamol.

Upozornenie: Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Neužívajte tento liek bez odporúčenia lekára, ak máte problémy s požívaním alkoholu alebo trpíte ochorením pečene alebo užívate akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.

Bez porady s lekárom neužívajte tento liek dlhšie ako 7 dní, deťom nepodávajúte viac ako 3 dni. Ak nedochádza k zmierneniu príznakov ochorenia do 3 dní, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Ak užijete viac Panadolu Horúci nápoj Mentol, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie a povedzte im presné množstvo lieku, ktoré ste užili. Ukážte im použité balenie a túto písomnú informáciu. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene. V prípade predávkovania je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.

Ak zabudnete užiť Panadol Horúci nápoj Mentol

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite zvyčajnú dávku lieku, hneď ako si spomeniete. Medzi dvoma dávkami zachovajte minimálny časový odstup 4 hodiny.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte liek užívať a ihneď informujte svojho lekára, ak:

- sa u vás vyskytnú alergické reakcie ako napr. kožná vyrážka alebo svrbenie, prípadne dýchacie ťažkosti alebo opuch pier, jazyka, hrdla alebo tváre;
- sa u vás vyskytne vyrážka s olupovaním kože alebo vredy v ústach;
- ste v minulosti mali ťažkosti s dýchaním po podaní kyseliny acetylsalicylovej alebo nesteroidných protizápalových liekov a ak podobné ťažkosti máte po podaní tohto lieku;
- sa u vás vyskytnú modriny alebo krvácanie nejasného pôvodu;
- ak sa u vás vyskytnú problémy s pečeňou.

Tieto vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Panadol Horúci nápoj Mentol

Tento liek uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajúte pri teplote do 30 °C.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na vrecku. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Panadol Horúci nápoj Mentol obsahuje

Liečivo je paracetamol 500 mg.

Ďalšie zložky sú sacharóza, aspartám (E951), kyselina vínna, natriumcitrát, príchuť čiernych ríbezlí, mentolová príchuť, azorubín (E122), oranžová žltá (E110), čerň brilantová (E151).

Ako vyzerá Panadol Horúci nápoj Mentol a obsah balenia

Panadol Horúci nápoj Mentol je svetloružový prášok s bielymi kryštálkami na prípravu perorálneho roztoku s ovocnou a mentolovou vôňou. Prášok sa rozpustí v horúcej vode na tmavočervený roztok.

Dodáva sa v jednodávkových vreckách, každé obsahuje 3,735 g prášku. Vrecká sú balené po 5, 6, 10, 12, 15, 20 alebo 24 kusoch v škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
mail: cz.info@gsk.com

Výrobca

SmithKline Beecham, S.A., Alcalá de Henares, Madrid, Španielsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
Tel. +421 2 4826 1111
Fax. +421 2 4826 1214

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2016.