

## Písomná informácia pre používateľa

**Toctino 10 mg**  
**Toctino 30 mg**  
**mäkké kapsuly**

alitretinoín

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Toctino a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Toctino
3. Ako užívať Toctino
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Toctino
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### 1. Čo je Toctino a na čo sa používa

Liečivo v Toctine je alitretinoín. Patrí do skupiny liekov známych ako *retinoidy*, ktoré sú podobné vitamínu A. Kapsuly Toctino sú dostupné v dvoch silách, s obsahom 10 mg alebo 30 mg alitretinoínu.

Toctino sa používa na liečbu dospelých so závažnou dlhotrvajúcou formou ekzému rúk, ktorý sa nezlepšil po iných miestnych liečbách zahrňujúcich steroidy. Na liečbu Toctinom musí dohliadať lekár v odbore kožné lekárstvo (dermatológ).

### 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Toctino

**Neužívajte Toctino**

- **ak ste tehotná** alebo môžete otehotnieť a nepoužívate účinné opatrenia na zabránenie tehotenstva (**pozri nižšie „Tehotenstvo a dojčenie“**),
- ak dojčíte,
- ak máte **ochorenie pečene**,
- ak máte **závažné ochorenie obličiek**,
- ak máte **vysoké hladiny tukov krvi** (ako je vysoká hladina cholesterolu alebo zvýšená hladina triacylglycerolov),
- ak máte **neliečené ochorenie štítnej žľazy**,
- ak máte **vysoké hladiny vitamínu A** vo vašom tele (*hypervitaminóza A*),
- ak ste **alergický** na alitretinoín, na iné retinoidy (napr. izotretinoín), na arašidy alebo sóju, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak **užívate tetracyklíny** (druh *antibiotík*).

- Ak sa vás niektoré z toho týka, **znovu navštívte svojho lekára. Toctino nesmiete užívať.**

## Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Toctino, obráťte sa na svojho lekára:

- **Ak ste niekedy trpeli problémami duševného zdravia**, zahrňujúcimi depresiu, samovražedné správanie alebo psychózu (závažná duševná porucha) alebo ak ste užívali lieky na ktorýkoľvek z týchto stavov.
- **Ak máte ochorenie obličiek**. Užívanie Toctina sa neodporúča u osôb so stredne závažným ochorením obličiek. Ak máte ochorenie obličiek - overte si u svojho lekára, či je pre vás Toctino vhodný.
- **Ak máte vysoké hladiny tukov v krvi**, môžete potrebovať častejšie vyšetrenia krvi. Toctino zvyčajne zvyšuje hladiny tukov v krvi, ako je cholesterol alebo triacylglyceroly. Ak hladiny tukov vo vašej krvi zostanú vysoké, váš lekár môže znížiť dávku alebo užívanie Toctina ukončiť.
- **Ak máte vysoké hladiny cukru v krvi (cukrovku)**, môžete potrebovať častejšie kontroly hladín cukru v krvi a váš lekár môže začať vašu liečbu nižšou dávkou Toctina.
- **Ak ste trpeli ochorením štítnej žľazy**. Toctino môže znižovať hladiny hormónu štítnej žľazy. Ak sú hladiny vášho hormónu štítnej žľazy nízke, váš lekár vám môže predpísať lieky nahradzujúce hormóny.

## Musíte byť zvlášť opatrný počas liečby:

- **Ak sa u vás objavia akékoľvek problémy so zrakom, okamžite to povedzte svojmu lekárovi**. Možno bude potrebné vysadiť Toctino alebo sledovať váš zrak.
- **Ak máte pretrvávajúcu bolesť hlavy**, nauzeu alebo vracanie (napínanie na vracanie alebo vracanie) a rozmazané videnie, tieto môžu byť príznakmi stavu nazývaného benígna interkraniálna hypertenzia. **Kapsuly prestaňte okamžite užívať** a čo najskôr sa skontaktujte so svojím lekárom.
- **Ak sa u vás objavia akékoľvek problémy duševného zdravia**, zahŕňajúce depresiu, samovražedné správanie alebo psychózu, **musíte okamžite prestať užívať kapsuly** a čo najskôr sa skontaktovať so svojím lekárom.
- **Ak máte krvavú hnačku, ihneď prestaňte kapsuly užívať** a čo najskôr sa skontaktujte so svojím lekárom.
- **Znížte vaše vystavenie sa slnečnému žiareniu** a vyhýbajte sa horskému slnku. Vaša pokožka sa môže stať citlivejšou voči slnečnému žiareniu. Predtým, ako sa vystavíte slnečnému žiareniu, použite prípravok na ochranu pred slnkom s vysokým ochranným faktorom (SPF 15 a viac). **Ak budete mať počas liečby suchú pokožku a pery**, používajte hydratačnú masť alebo krém a balzam na pery.
- **Znížte prílišnú fyzickú námahu**: alitretinoín môže spôsobovať bolesť svalov alebo bolesť kĺbov.
- **Ak sa u vás objaví suchosť v očiach**, môže vám pomôcť zvlhčujúca očná masť alebo kvapky nahradzujúce slzy. Ak používate kontaktné šošovky, možno bude potrebné, aby ste počas liečby alitretinoínom používali okuliare. Suché oči a problémy s videním zvyčajne po ukončení liečby spontánne vymiznú.
- **Toctino môže zvýšiť hladiny pečeňových enzýmov**. váš lekár vám počas liečby bude robiť krvné vyšetrenia na kontrolu týchto hladín. Ak zostanú vysoké, váš lekár vám môže znížiť dávku alebo ukončiť liečbu Toctinom.

## Deti a dospelávajúci

Toctino sa neodporúča pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nie je známe, ako účinkuje v tejto vekovej skupine.

## Iné lieky a Toctino

Počas užívania Toctina **neužívajte iné lieky s obsahom retinoidov (napr. izotretinoín), vitamín A alebo tetracyklíny** (druh antibiotika). Toto zvyšuje riziko vedľajších účinkov.

### **Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak:**

- užívate **amiodarón** (liek, ktorý pomáha regulovať srdcovú frekvenciu). Amiodarón sa neodporúča užívať spolu s Toctinom.
- užívate **ketokonazol, flukonazol, mikonazol** (lieky používané na liečbu infekcií). Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám zníži dávku Toctina.
- užívate **simvastatín** (liek používaný na zníženie hladiny cholesterolu). Toctino môže znižovať množstvo tohto lieku v tele.
- užívate **gemfibrozil** (ďalší liek používaný na zníženie hladiny cholesterolu) alebo **oxandrolón** (anabolický steroid). Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám zníži dávku Toctina.
- užívate **paklitaxel** (používa sa na liečbu rakoviny), **rosiglitazón** alebo **repaglinid** (používajú sa na liečbu cukrovky). Toctino môže znižovať množstvo týchto liekov v tele.

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, **povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi**. To sa týka aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekárske predpis a rastlinných liekov.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

#### **Dôležité odporúčanie pre ženy**

#### **Ak dojdete, neužívajte Toctino.**

- Je pravdepodobné, že liek prestupuje do materského mlieka a môže pôsobiť škodlivo na vaše dieťa.

#### **Ak ste tehotná, neužívajte Toctino.**

Je pravdepodobné, že Toctino spôsobí závažné vrodené chyby (v lekárskom jazyku to znamená, že je teratogénny). Liek takisto zvyšuje riziko potratu.

- **Ak ste tehotná, nesmiete užívať Toctino.**
- **Počas liečby alebo mesiac po liečbe Toctinom nesmiete otehotnieť.**

#### **Ak ste žena a mohli by ste otehotnieť:**

#### **Kvôli riziku vzniku vrodených porúch (poškodenie nenarodeného dieťaťa) nesmiete užívať Toctino, pokiaľ nesplníte nasledujúce PRÍSNE opatrenia:**

- **Váš lekár vám musí vysvetliť riziko vrodených porúch:** porozumiete tomu, prečo nesmiete otehotnieť a čo musíte urobiť, aby ste tomu zabránili.
- **Musíte prekonzultovať antikoncepciu** (zabránenie počatiu) so svojím lekárom. Ten vám poskytne informácie, ako predísť tehotenstvu. Môže vás tiež odporučiť k odborníkovi, aby vám poradil s antikoncepciou.
- **Musíte súhlasiť s používaním jednej alebo najlepšie dvoch účinných metód antikoncepcie, zahrňujúcimi prezervatív alebo pesar spolu s prípravkom účinkujúcim proti spermiiam** mesiac pred užívaním Toctina, počas liečby a mesiac po liečbe. Jeden mesiac predtým, ako začnete liečbu, a na začiatku liečby vás lekár požiada, aby ste si urobili tehotenský test, ktorý musí byť negatívny.
- **Musíte používať antikoncepciu, i keď nemáte menštruáciu** alebo v súčasnosti nežijete aktívnym pohlavným životom dovtedy, kým váš lekár nerozhodne, že už definitívne nehrozí riziko tehotenstva (napríklad preto, že vaša maternica bola odstránená).
- **Musíte súhlasiť s mesačnými kontrolami** a s vykonaním viacerých tehotenských testov počas liečby a približne 5 týždňov po ukončení liečby podľa rozhodnutia lekára. Tieto testy sa majú vykonať počas prvých 3 dní menštruačného cyklu. Počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby nesmiete otehotnieť.
- **Váš lekár vás (alebo vášho zákonného zástupcu) môže požiadať, aby ste podpísali formulár**, ktorý potvrdí, že ste boli poučená o rizikách a že súhlasíte s potrebnými opatreniami.

Predpísanie lieku pre ženy, ktoré môžu otehotnieť, nemá byť na viac ako 30 dní liečby. Pre ďalšiu liečbu je potrebné nové predpísanie lieku. Každý lekárske predpis je platný 7 dní.

- **Ak počas liečby Toctinom alebo počas jedného mesiaca po ukončení liečby otehotniete alebo si budete myslieť, že ste tehotná**, okamžite prestaňte užívať tento liek a skontaktujte sa so svojim lekárom. Môže vás odporučiť k odborníkovi, aby vám poradil.

**Váš lekár vám ukáže písomné informácie o tehotenstve a antikoncepcii určené pre užívateľov Toctina.** Ak ste ešte tento materiál nevideli, požiadajte o to svojho lekára.

#### **Odporúčanie pre mužov**

Veľmi malé množstvo alitretinoínu je prítomné v semene mužov užívajúcich Toctino, avšak príliš malé na to, aby poškodilo nenarodené dieťa (plod) vašej partnerky. Musíte si zapamätať, že sa so svojim liekom nemôžete s nikým deliť, najmä nie so ženami.

#### **Poučenie pre obe pohlavia**

**Pokiaľ užívate Toctino alebo počas jedného mesiaca po liečbe, nesmiete darovať krv.** Ak sa tehotnej žene podá vaša krv, dieťa sa môže narodiť s vrodenými chybami. Váš liek nikdy nedávajte nikomu inému. Po ukončení liečby vráťte nepoužitý liek do lekárne.

#### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Počas liečby môžete v noci zle vidieť. Ak toto u vás nastane, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

#### **Toctino obsahuje sójový olej a sorbitol**

Ak máte alergiu na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojim lekárom pre užitím Toctina.

### **3. Ako užívať Toctino**

#### **Kedy užívať kapsuly**

Kapsuly sa majú užívať s hlavným jedlom, najlepšie každý deň v rovnakom čase. Kapsuly sa majú prehltnúť celé a nežuvať.

#### **Aké množstvo užívať**

Dávka je buď 10 mg, alebo 30 mg jedenkrát denne. Ak vaše telo nedokáže tolerovať odporúčanú 30 mg dávku, môže vám byť predpísaná nižšia 10 mg dávka.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

#### **Ako dlho máte kapsuly užívať**

Cyklos liečby zvyčajne trvá 12 až 24 týždňov v závislosti od toho, ako vaše ochorenie reaguje na liečbu. Ak bola vaša prvá liečba úspešná, váš lekár vám môže predpísať ďalší cyklus liečby, ak sa vám príznaky vrátia.

#### **Ak užijete viac Toctina, ako máte**

Ak ste užili príliš veľa kapsúl alebo niekto iný náhodne užil váš liek, okamžite sa skontaktujte so svojim lekárom, lekárnikom alebo choďte do najbližšej nemocnice.

#### **Ak zabudnete užiť Toctino**

Ak zabudnete dávku užiť, urobte tak hneď, ako budete môcť. Ak sa však blíži čas užitia vašej ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú kapsulu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

#### 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejaví u každého.

veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov
časté: postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov
menej časté: postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov
zriedkavé: postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov

##### Veľmi časté vedľajšie účinky:

- **Bolesť hlavy.**
- **Zvýšené hladiny tukov v krvi:** vyššie hladiny tukov (triacylglycerolov) a cholesterolu v krvi.

##### Časté vedľajšie účinky

- **Depresia a iné problémy duševného zdravia:** depresia zahŕňajúca smutnú náladu alebo pocit prázdnoty.
  - Člena rodiny alebo blízkeho priateľa by ste mali informovať o tom, že počas užívania Toctina u vás môže vzniknúť depresia alebo významné zmeny nálady alebo správania a požiadať ho, aby si prečítal túto písomnú informáciu. Môže byť vhodné, ak ho požiadate, aby vás sledoval a povedal vám, ak si u vás všimne depresiu alebo iné zmeny správania.
- **Poruchy krviniek:** zvýšenie počtu krvných doštičiek (bunky, ktoré sa podieľajú na zrážaní krvi), zníženie počtu červených a bielych krviniek pozorované pri vyšetrení krvi.
- **Problémy so štítnou žľazou:** znížené hladiny hormónov štítnej žľazy.
- **Problémy s očami:** zápal oka (konjunktivitída) a okolia očného viečka; pocit sucha a dráždenia v oku.
  - Požiadajte lekárnik o vhodné očné kvapky. Ak používate kontaktné šošovky a máte suché oči, môže byť potrebné, aby ste používali okuliare.
- **Problémy s ušami:** pretrvávajúci zvuk v ušiach (tinnitus).
- **Závraty.**
- **Krv a obehová sústava:** návaly tepla, vysoký krvný tlak (hypertenzia).
- **Problémy s črevami a žalúdkom:** napínanie na vracanie (nauzea), vracanie, sucho v ústach.
- **Bolesť svalov a kĺbov:** bolesť svalov, bolesť kĺbov, nedostatok energie (únava). Vysoké hladiny odpadových látok pochádzajúcich zo svalov vo vašej krvi počas nadmernej záťaže.
- **Problémy s kožou a vlasmi:** suchá pokožka, najmä tváre, suché a zapálené pery, začervenanie pokožky, svrbivá kožná vyrážka, zapálená pokožka, vypadávanie vlasov.
- **Problémy s pečeňou:** zvýšené hladiny pečeňových enzýmov pozorované pri krvných vyšetreniach.

##### Menej časté vedľajšie účinky

- **Problémy s videním** zahŕňajúce rozmazané videnie, skreslené videnie, tmavú plochu na oku (zákal rohovky, šedý zákal).
  - Ak je váš zrak poškodený, **okamžite prestaňte užívať Toctino** a skontaktujte sa so svojím lekárom.
- **Poruchy kože:** svrbivá pokožka, olupovanie kože, vyrážka, suchý ekzém na koži.
- **Problémy s ušami, nosom a hrdlom:** krvácanie z nosa.
- **Problémy s črevami a žalúdkom:** porucha trávenia (dyspepsia).
- **Poruchy kostí:** kostné výrastky, vrátane poruchy chrčtice - ankylozujúcej spondylitídy.

##### Zriedkavé vedľajšie účinky

- **Pretrvávajúca bolesť hlavy** súčasne s napínaním na vracanie (nauzea), vracaním (dávením) a zmenami zraku zahŕňajúcimi rozmazané videnie. Môžu to byť prejavy benígnej intrakraniálnej hypertenzie.
  - Ak spozorujete tieto príznaky, **okamžite prestaňte užívať Toctino** a skontaktujte sa so svojím lekárom.
- **Krv a obehová sústava:** zápal krvných ciev.
- **Problémy s kožou:** poruchy nechtov, zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.

### **Ďalšie vedľajšie účinky**

U veľmi malého počtu osôb sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale ich presná častota výskytu nie je známa:

**Závažné alergické reakcie.** Medzi ich prejavy patria:

- vyvýšená a svrbivá vyrážka (žihľavka),
  - opuch, niekedy postihujúci tvár alebo ústa (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním,
  - kolaps.
- **Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, okamžite sa obráťte na svojho lekára. Prestaňte užívať Toctino.**

**Poruchy žalúdka a čriev.** Závažné bolesti žalúdka (brucha) s krvavými hnačkami alebo bez nich, napínanie na vracanie a vracanie.

- **Okamžite prestaňte užívať Toctino** a skontaktujte sa so svojím lekárom. Môžu to byť prejavy závažných ochorení čriev.

**Zmeny nálady alebo myšlienky na spáchanie samovraždy.** Plačlivosť a emočná porucha.

Niektorí ľudia mali sebapoškodzovacie alebo samovražedné myšlienky, pokúsili sa o samovraždu alebo spáchali samovraždu. Títo ľudia sa nemusia javiť ako depresívni.

- **Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom**, ak sa u vás objavia prejavy ktoréhokoľvek z týchto problémov duševného zdravia. Váš lekár vám povie, aby ste prestali užívať Toctino. To nemusí stačiť na to, aby u vás uvedené príznaky vymizli: možno budete potrebovať ďalšiu pomoc, ktorú môže zariadiť váš lekár.

**Problémy s videním počas noci.** Problémy s videním po ukončení liečby zvyčajne vymiznú.

**Krv a krvný obeh:** opuch rúk, dolných častí nôh a chodidiel (periférny edém).

### **Vedľajšie účinky iných liekov z rovnakej skupiny ako Toctino**

Tieto účinky doteraz neboli pozorované pri Toctine, avšak nie je možné ich vylúčiť.

Sú veľmi zriedkavé a môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 používateľov.

**Diabetes mellitus.** Nadmerný smäd, častá potreba močiť, vyšetrenia krvi ukazujú zvýšenie hladiny cukru v krvi. Môžu to byť prejavy cukrovky.

**Poruchy kostí.** Zápal kĺbov, poruchy kostí (oneskorený rast, zmeny v hustote kosti), vyvíjajúce sa kosti môžu prestať rásť.

**Poruchy oka a videnia.** Farbosleposť a farebné videnie sa môžu zhoršiť; neznášanlivosť kontaktných šošoviek.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo **na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať Toctino**

**Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.**

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP.

Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Blistre uchovávajte v škatuli na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### Čo Toctino obsahuje

- Liečivo je alitretinoín.  
Toctino 10 mg: Jedna mäkká kapsula obsahuje 10 mg alitretinoínu.  
Toctino 30 mg: Jedna mäkká kapsula obsahuje 30 mg alitretinoínu.
  
- Ďalšie zložky sú:  
Toctino 10 mg:  
Čistený sójový olej, čiastočne hydrogenovaný sójový olej, stredne nasýtené triacylglyceroly, žltý vosk, tokoferol alfa, želatína, glycerol, tekutý sorbitol (nekryštalizujúci), čistená voda, červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172).  
Toctino 30 mg:  
Čistený sójový olej, čiastočne hydrogenovaný sójový olej, stredne nasýtené triacylglyceroly, žltý vosk, tokoferol alfa, želatína, glycerol, tekutý sorbitol (nekryštalizujúci), čistená voda, červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172).

### Ako vyzerá Toctino a obsah balenia

Toctino 10 mg:

Mäkké kapsuly, asi 11 mm dlhé a 7 mm široké, oválne, **hnedej** farby a s označením „A1“.

Kapsuly sú dostupné v blistrových baleniach po 30 kapsúl.

Toctino 30 mg:

Mäkké kapsuly, asi 13 mm dlhé a 8 mm široké, oválne, **červeno-hnedej** farby a s označením „A3“.

Kapsuly sú dostupné v blistrových baleniach po 30 kapsúl.

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika

### Výrobca

SwissCaps GmbH

Grassingerstrasse 9

D-83043 Bad Aibling

Nemecko

**Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)**

**pod nasledovnými názvami:**

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo: **Toctino**

Grécko: **Cehado**

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2018.**